



PATIENTINFORMATION
KEGLESNIT PÅ LIVMODERHALSEN

Celleforandringer på livmoderhalsen er meget hyppige og opdages oftest pga. blødning ved samleje og efter screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft, som alle kvinder i Danmark indkaldes til fra 23-årsalderen.

Celleforandringer opstår pga. infektion med HPV-virus og oftest forsvinder celleforandringerne af sig selv. For at afklare om der er tale om celleforandringer foretages kikkertundersøgelsen (kolposkopi med biopsier og skrab fra livmoderhalsen). Hvis denne undersøgelse viser moderate eller sværere forandringer, som indenfor få år kan mistænkes af udvikle sig til kræft, anbefales et keglesnit.

Flere tusind kvinder får årligt foretaget dette indgreb. Unge piger tilbydes nu vaccination mod HPV-virus og vi håber derfor, at der kommer et stort fald i antallet af keglesnit fremover. Efter et keglesnit er det vigtigt at få 3 vaccinationer mod livmoderhalskræft (Gardasil 9), da det reducerer risikoen for at få celleforandringer igen. 1. vaccination skal helst gives inden 14 dage efter operationen.

FORBEREDELSE

Vi anbefaler, at du inden operationen har læst denne folder samt folderen "generel vejledning i forbindelse med din operation".

Faste

Operationen foregår oftest i lokalbedøvelse og faste er kun nødvendig, hvis vi har aftalt operation i fuld bedøvelse.

Pause med medicin


Se folderen "Vanlig medicin i forbindelse med din operation"

OPERATION

På operationsdagen skal du blot henvende dig i receptionen, så vil du blive modtaget af vores sygeplejersker. Keglesnit er et lille indgreb. Formålet med indgrebet er at fjerne det lille stykke af livmoderhalsen, som indeholder celleforandringerne.

Operationen udføres igennem skeden og varer 20 minutter. Under indgrebet ligger du på ryggen med benene oppe i nogle benstøtter (helt som ved en gynækologisk undersøgelse). Ved hjælp af en slynge fjernes et kegleformet stykke væv fra livmoderhalsen. Vævet bliver efterfølgende undersøgt under mikroskop for at sikre, at områderne med celleforandringer er fjernet.

Når operationen er afsluttet, bliver du kørt til opvågningen, hvor du sunder dig en ½ time. Inden du går hjem, kommer gynækologen og taler med dig om det videre forløb. Du bør holde dig i ro resten af dagen.



EFTER UDSKRIVELSEN

Smerter

Det er normalt, at der kommer menstruationslignende smerter efter indgrebet. Som regel aftager smerterne efter et par timer. Du får nogle smertestillende piller med hjem, som kan lindre smerterne.

Blødning

Såret på livmoderhalsen heler op i løbet af 1 - 3 uger. Under ophelingsfasen kan du have øget udflåd, som kan være blandet med lidt blod.

Hygiejne

For at undgå infektion skal du bruge bind og ikke tamponer. Du kan roligt tage brusebad, men du skal undgå karbad, svømmehal og havbad, indtil blødningen er ophørt.

Samleje

Du skal undgå samleje 10-14 dage.

Fysisk aktivitet

Dagen efter operationen kan du genoptage dine vanlige aktiviteter. Dog bør du undgå hård fysisk træning de første 8-10 dage.

Efterkontrol

Videre plan afhænger af mikroskopisvaret, men vil oftest blot være en celleprøve fra livmoderhalsen taget hos din egen læge eller hos gynækolog efter 6 måneder.

Mulige bivirkninger og komplikationer

Efter keglesnit ses en lidt øget risiko for tidlig fødsel i evt. efterfølgende graviditet. Ved graviditetsundersøgelse skal du derfor oplyse din læge om at du har fået foretaget keglesnit.

Inden for den første uge kan der i få tilfælde opstå komplikationer i form af stærke smerter, feber eller blødning, som er kraftigere end en normal menstruation. Hvis disse komplikationer opstår, skal du kontakte CPH-Privathospital på tlf. (hverdage mellem 8 - 16) eller tlf. (aften og weekend). Alternativt 1813.



KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til CPH Privathospital.

CPH Privathospital

Rådhusstorvet 4

3520 Farum

Tlf.: 7021 8000

www.cph-privathospital.dk

E-mail: info@cph-privathospital.dk

Åbningstider

Telefon mandag til fredag fra

Kl. 8.00-16.00 på tlf. 7021 8000