

PATIENTINFORMATION

Dræn i trommehinde

CPH Privathospital A/S
Rådhusstorvet 4, 3520 Farum | +45 7021 8000
www.cph-privathospital.dk
Mail: info@cph-privathospital.dk





På CPH Privathospital sætter vi patienten i centrum.
Vores mål er at tilbyde den absolut bedste
behandling med hurtig udredning og et trygt
efterforløb- alt sammen i indbydende og
behagelige omgivelser.

Rigtig mange forældre har oplevet, at deres børn får ørepine. Det kan skyldes forskellige sygdomme i øret. Den hyppigste årsag til øreproblemer hos børn er væske i mellemøret, som skyldes en tillukning af det eustakiske rør, som forbinder næsesvælget med mellemøret.

Tillukning af det eustakiske rør medfører, at der hurtigt udvikler sig et undertryk i mellemøret, som kan give øresmerter. Man ser også en gang imellem det samme hos voksne. Nogle gange provokeres tilstanden af forkølelse, eller at man ikke får trykudlignet i forbindelse med en flylanding.

Når der har været undertryk i mellemøret gennem længere tid, danner der sig væske i mellemøret. Væsken er i begyndelsen tyndtflydende, men bliver senere mere slimet, hvorfor englænderne også kalder tilstanden for "glue ear".

Når luften i mellemøret erstattes af væske eller slim,

får børnene nedsat hørelse og ofte tilbagevendende ørepine. For mange børn påvirker hørenedsættelsen sprogudviklingen og kan give anledning til en ændret adfærd.

Behandling

Væske i mellemøret behandles ved at suge væske ud gennem et lille snit i trommehinden. Er der tale om "glue ear", indsætter speciallægen samtidig et dræn i trommehinden for at sikre en trykudligning af mellemøret. Samtidig letter drænet muligheden for, at sekretet kan passere ud gennem det drænet rør. Hos børn kræver indsættelse af drænet en kortvarig fuld bedøvelse, mens det hos voksne kan klares i lokalbedøvelse.

Forundersøgelse

Du/I kommer først til en forundersøgelse, hvor speciallægen i øre-næse-halskirurgi lytter til de gener, som du/barnet har. Ørerne undersøges, og der foretages en høreprøve med måling af mellemøretrykket.

Er der behov for behandling med indlæggelse af et dræn, bliver der hos voksne ofte lagt dræn med det samme i lokalbedøvelse.

Er det et barn, som skal have dræn, gennemgår speciallægen forløbet samt mulige bivirkninger og komplikationer med jer. I taler desuden om, hvad I kan forvente af operationen.

Datoen for operationen kan I selv være med til at bestemme, så den passer ind i jeres kalender.

Forventninger

Du/I kan forvente, at anlæggelse af dræn medfører en umiddelbar normalisering af hørelsen.

Fjernelse af drænet?

Drænet falder ud af sig selv efter ½-1 år (en gang imellem efter endnu længere tid). Drænet ligger så i en lille klat ørevoks inde i øregangen og gør ingen skade. Det kommer således ud af sig selv.

Hvis der igen kommer problemer med øret, kan det blive nødvendigt med et nyt dræn.

Forberedelse

Hvis indgrebet foregår i lokalbedøvelse i forbindelse med forundersøgelsen, er der ingen forberedelse.

Ellers anbefaler vi, at du/I inden operationen har læst denne folder samt folderen *"Generel vejledning i forbindelse med din operation"*.

Hvis dit barn skal opereres, skal du som forælder også læse folderen *"Børn og operation"*.

Faste

Operationen forgår hos børn i fuld bedøvelse, og barnet skal derfor møde fastende til operationen.

Pause med medicin

Se angående dette i folderen *"Generel vejledning i forbindelse med din operation"* eller *"Vanlig medicin forbindelse med din operation"*.

Personlige ejendele

Lad venligst personlige ejendele som fx smykker og an-



dre værdigenstande blive hjemme, da de ikke må bæres under operation og indlæggelse.

Dagkirurgi (ambulant)

Anlæggelse af dræn bliver lavet som dagkirurgi, og I kan forvente at blive udskrevet få timer efter operationen.

Operation

Inden operationen bliver barnet lagt i fuld narkose. Når drænene er lagt, afsluttes bedøvelsen, og barnet vækkes.

Efter operationen

Efter anlæggelsen af dræn taler du/I med speciallægen og sygeplejersken, som informerer om planen og forholdsregler i tiden efter operationen.

Efter udskrivelsen

Smerter

Normalt vil der ikke være særlige smerter, men i givet fald kan det klares med smertestillende håndkøbsmedicin.

Restriktioner

Efter operationen er der ingen andre restriktioner, end at du/barnet ikke må dykke mere end højst ½ meter ned. Ved dykning længere ned, kan der trænge vand ind gennem drænet.

Ambulant opfølgning

Efter 2-3 uger kommer du/I ind til tjek af drænets funktion enten hos os eller hos egen ørelæge.

Mulige bivirkninger og komplikationer

Der er en lille risiko for, at der kan komme infektion i øret, når der er dræn i trommehinden. Det viser sig ved, at der kommer flåd fra øregangen. Hvis drænet fungerer godt, kommer der ingen smerter. Infektionen vil i de fleste tilfælde kunne behandles med øredråber. Det er undtagelsen, at det er nødvendigt at fjerne drænet pga. infektion.

Når drænet efter ½-1 år falder ud af sig selv, lukker hullet i trommehinden i langt de fleste tilfælde af sig selv. Men i enkelte tilfælde efterlades et lille hul i trommehinden.

Kontakt til lægen

Du får udleveret telefonnummer til den læge, som har opereret dig, hvis der skulle opstå problemer de første 24 timer efter operationen/udskrivelsen.

Herefter skal du altid kontakte CPH Privathospital på tlf. nr. 7021 8000.

Yderligere informationer

Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

CPH Privathospital A/S

Rådhusstorvet 4 3520 Farum

 +45 7021 8000

 www.cph-privathospital.dk

 info@cph-privathospital.dk

Åbningstider

Telefon mandag til fredag fra
kl. 8.00-16.00 på tlf. 7021 8000

Uden for normal åbningstid kan sygeplejerske
kontaktes på: 44 500 339

I akutte tilfælde udenfor CPH Privathospitals
åbningstid, henvises til 1813